

15. POMOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH ODRŮD SLIVONÍ

Výběr vhodných odrůd pro extenzivní výsadby.

ALTHANOVA RENKLÓDA (renklóda)

Strom: roste bujně, vedoucí větve směřují šikmo vzhůru a tvoří široce kulovitou korunu.

Odolnost: proti mrazu dostatečná, v květu v období jarních mrazíků také.

Stanoviště: náročná na hlubokou a živnou půdu. Vhodná i pro vyšší polohy.

Tvar a podnož: kmenné tvary i zákrsky. Afinita dobrá se všemi slivoňovými podnožemi s výjimkou semenáče 'Zelené renklódy'. Doporučuje se Myrobalán.

Opylovací poměry: je cizosprašnou odrůdou. Vhodnými opylovači jsou 'Kirkeho', 'Ontario', 'Oullinská'.

Plodnost: plodí brzy, hojně a pravidelně.

Plod: veliký až velmi veliký, kulovitý

Slupka: základní barva je narůžověle žlutá s krycí barvou tmavě oranžovou až fialově hnědou.

Stopka: je krátká, tlustá, zelenavá sedící v úzké a hluboké jamce.

Rýha: je středně hluboká, táhne se od stopky a zpravidla dělí plod ve dvě nestejně poloviny.

Pecka: velká, široká, oddělující se od dužniny.

Dužnina: je růžově žlutá, měkká, velmi šťavnatá

Zrání: zraje v druhé polovině srpna.

DOMÁČÍ ŠVESTKA A JEJÍ TYPY – DOLANKA, KOUŘIMSKÁ, MUŠKÁTOVÁ (švestka)

Strom: v mládí vytváří pyramidální korunu, později široce kulovité

Odolnost: v odpovídajících polohách je téměř mrazuodolná. V květu proti jarním mrazíkům středně odolná.

Stanoviště: vyžaduje výhřevné polohy, s půdami bohatými na živiny.

Tvar a podnož: vyhovují kmenné tvary. Myrobalán pro sušší půdy, Durancie pro půdy výhřevné.

Opylovací poměry: je samosprašná.

Plodnost: je brzká, pravidelná a veliká.

Plod: je středně veliký až větší, tvaru oválného, k oběma koncům zúžený.

Slupka: je tmavomodře nafialovělá, modře ožíněná.

Stopka: je dlouhá, slabá, středně tlustá, jemně chloupkatá, sedí v mělké a , dost široké stopečné jamce.

Rýha: sotva znatelná.

Pecka: k oběma koncům protáhle zašpičatělá.

Dužnina: zelenožlutá až žlutě oranžová, pevná, šťavnatá, jemná.

Zrání: zraje v druhé až třetí dekádě září. Přezrálé plody neopadávají.

MIRABELKA NANCYSKÁ

Strom: roste středně bujně, vytváří kulovitou korunu.

Odolnost: je dostatečně mrazuodolná. Květ je odolný vůči pozdním jarním mrazíkům.

Stanoviště: Náročná na teplá stanoviště a přiměřeně vlhké půdy.

Tvar a podnož: vhodná pro kmenné tvary. Má dobrou afinitu ke všem slivoňovým podnožím. Zvláště se doporučuje myrobalán.

Opylovací poměry: je částečně samosprašná.

Plodnost: brzká, veliká a pravidelná.

Plod: Je malý, kulovitý.

Slupka: je žlutá až zlatistá, na osluněné straně s hustými červenými tečkami, bělavě ožíněná. Je velice pevná, tenká a v plné zralosti se dá oddělit od dužniny.

Stopka: středně dlouhá, tenká, zelená. Sedí v malé a ploché jamce.

Rýha: je zcela plochá

Pecka: je malá, široce elipsovité, dobře odlučitelná od dužniny.
Zrání: dozrává od poloviny srpna postupně 2 – 3 týdny

ZELENÁ RENKLÓDA (renklóda)

Strom: roste velice bujně

Odolnost: květ v období pozdních jarních mrazíků je středně odolný. Plody jsou celkově náchylné k pukání, monilióze. Odolnost dřeva proti mrazu je střední.

Stanoviště: je velice náročná na teplé polohy, dostatečně vlhké půdy. Je vhodná pro stromořadí.

Tvar a podnož: kmenné tvary, jako podnož se doporučuje durancie nebo semenáč Saint Julien i myrobalán – jen do horších půd.

Opylovací poměry: je cizosprašná. Vhodnými opylovači jsou odrůdy – Althanova renklóda, Domácí švestka, Oullinská, Vlaška.

Plodnost: středně pozdní, nepravidelná a střední.

Plod: je středně veliký, kulovitý.

Slupka: má barvu zelenou, přecházející do žluté. na osluněné straně je pokryta červenohnědými tečkami. Je bělavě ojíňená, tenká a měkká.

Stopka: je krátká až středně dlouhá, zeleno hnědá, jemně chloupkatá.

Rýha: je mělká, široká a dělí plod na dvě stejné poloviny.

Pecka: je malá, krátká, široce elipsovité, dobře se odděluje od dužniny.

Dužnina: je zelenožlutá, měkká i tuhá a šťavnatá.

Zrání: zraje od poloviny srpna, plody dozrávají postupně.

BRNĚNSKÁ (švestka)

Strom: v mládí roste bujně, později růst zpomaluje, vytváří malé nálevkovité koruny.

Odolnost: proti mrazu je velká. také v květu je odolná. Netrpí pukáním plodů v období dešťů.

Stanoviště: pro svoji ranost vyžaduje teplá stanoviště a chráněné polohy. Vyžaduje dobré půdy dostatečně zásobené vláhou.

Tvar a podnož: vyhovují kmenné tvary a zákrsky. Má dobrou afinitu ke všem slivoňovým podnožím. Velmi dobře plodí na myrobalánu.

Opylovací poměry: je samosprašná

Plodnost: brzká, pravidelná.

Plod: je malý, protáhlý

Slupka: má tmavomodrou barvu s bělavým ojíňením. Je velice tenká.

Stopka: je středně dlouhá, tenká, zelená, sedí v mělké stopečné jamce.

Rýha: neznatelná.

Pecka: je malá, velmi úzká a špičatá, téměř hladká, snadno odlučitelná od dužniny.

Dužnina: je zeleno žlutá nebo červeně žíhaná, velice šťavnatá a pevná.

Zrání: dozrává od poloviny července. Zralé plody opadávají ze stromu.

BRYSKÁ (slíva)

Strom: roste středně bujně a vytváří kulovité koruny

Odolnost: v květu je odolný.

Stanoviště: nenáročná, vhodná do všech poloh.

Tvar a podnož: vyhovují kmenné tvary a zákrsky. Má dobrou afinitu ke všem slivoňovým podnožím. doporučují se především myrobalán a Saint Julien.

Opylovací poměry: je cizosprašná. Dobrymi opylovači jsou odrůdy Viktorie, Albachova a Carská.

Plodnost: pozdější a pravidelná.

Plod: je malý, kulatý ze stran zploštělý.

Slupka: základní barva je zelenavě červená až rudá s rzivými skvrnkami a šedým ojíňením.

Stopka: je středně dlouhá, chloupkatá, zelená usazená v hlubší stopečné jamce.

Rýha: je mělká a dělí plod na dvě stejné poloviny.

Pecka: menší, okrouhlá a na pólech tupá. Při dozrávání se odděluje dobře od dužniny.

Dužnina: je zelenavě žlutá, polotuhá, jemná a šfavnatá.

Zrání: zraje koncem července. dozrává postupně a drží na stromě v plné zralosti 1 – 2 týdny.

KATALONSKÝ ŠPENDLÍK

Strom: v mládí roste bujně, později růst ustává., vytváří malé kulovité koruny.

Odolnost: květ v období pozdních jarních mrazíků je velice odolný.

Stanoviště: vyžaduje teplé polohy s půdami zásobenými živinami.

Tvar a podnož: je vhodný jak pro kmenné tvary tak pro zákrsky. Má dobrou afinitu ke všem slivoňovým podnožím.

Opylovací poměry: je cizosprašný. Opyluje se odrūdami: Althanova renklóda, Domáci švestka, Ontario.

Plodnost: brzká, pravidelná, hojná.

Plod: je malý, kapkovitého tvaru až vejčitý, ke stopce se zužuje.

Slupka: je žlutá. na osluněné straně hnědožlutá s bělavým ojíněním.

Stoka: je velice krátká, zelená, chloupkatá, zasazená do úzké a hluboké stopečné jamky.

Rýha: velice mělká a dělí plod na dvě nestejně poloviny.

Pecka: malá, protáhlá a dobře se odděluje od dužniny.

Dužnina: je žlutá až oranžová, tuhá, jemná a málo šfavnatá.

Zrání: zraje koncem července, přezrálé plody opadávají.

MALVAZINKA (slíva)

Strom: roste bujně a vytváří širokou nálevkovitou korunu.

Odolnost: ve dřevě je odolnost proti mrazu velice malá. Květy jsou odolné.

Stanoviště: je velice náročná na půdu a chráněné teplé polohy.

Tvar a podnož: kmenné tvary. Má dobrou afinitu ke všem slivoňovým podnožím. Doporučuji se převážně podnože – myrobalán.

Opylovací poměry: je cizosprašná, opyluje se odrūdami: Althanova renklóda, Kirkeho, Mirabelka nancyská a Zelená renklóda.

Plodnost: je brzká, velice střídavá.

Plod: veliký, kulovitý

Slupka: má růžovou až tmavě červenou barvu s šedomodrým ojíněním. Slupka je velice tuhá a má nepříjemnou nakyslou chuť.

Stopka: je krátká, zelená a lysá. Sedí v hluboké stopečné jamce.

Rýha: velice mělká, pouze hmatná.

Pecka: je velká, oválná, částečně odlučitelná od dužniny.

Dužnina: je zelenavá až nažloutlá, tuhá, šfavnatá.

Zrání: zraje začátkem srpna a to postupně, plody nutno protrhávat.

OULLINSKÁ (renklóda)

Strom: roste bujně, vytváří řídkou, vysokou a širokou kulovitou korunu.

Odolnost: proti mrazu je dobrá. V květu při jarních mrazících je odolná.

Stanoviště: vhodná do středních poloh, kde vyžaduje chráněné a záhřevné půdy.

Tvar a podnož: kmenné tvary. Má dobrou afinitu ke všem slivoňovým podnožím, s výjimkou semenáče Zelené renklódy.

Opylovací poměry: je samosprašná.

Plodnost: brzká a pravidelná.

Plod: veliký až velmi veliký.

Slupka: má žlutou barvu, ve stínu zelenavou s červeným zabarvením na sluneční straně. Je velice jemná s nakyslou chutí.

Stopka: je dlouhá, dosti tlustá, téměř lysá.

Rýha: je velice mělká a dělí plod na dvě stejné poloviny.

Pecka: je velká, tlustá, široká, částečně odlučitelná od dužniny.

Dužnina: je zelenavě žlutá, pevná a šťavnatá.

Zrání: začíná zrát na počátku dekády srpna a zraje do konce srpna.

VLAŠKA A JEJÍ TYPY (švestka)

Strom: v mládí roste velice bujně a křivě. Dospělé kmeny bývají často pokřivené. vytváří středně velikou, převislou korunu.

Odolnost: proti mrazu je dosti malá.

Stanoviště: je velice náročná na teplé polohy a půdy zásobené živinami.

Tvar a podnož: kmenné tvary. Má dobrou afinitu ke všem slivoňovým podnožím.

Opylovací poměry: je samosprašná.

Plodnost: je středně pozdní.

Plod: je větší, švestkovitý, u stopky z jedné strany šikmo zkosený.

Slupka: je fialově modrá až hnědě tmavomodrá, světle modře ojíněná.

Stopka: je středně dlouhá, tlustá a chloupkatá. Tlustým koncem zasazená do mělké, k jedné straně vyvýšené stopečné jamce.

Rýha: je mělká

Pecka: je velká, dlouhá, baňatá, na stopečném konci protáhlá. Částečně odlučitelná od dužniny.

Zrání: dozrává začátkem září, asi 1 – 2 týdny před 'Domácí švestkou'.

WANGENHEIMOVA (pološvestka)

Strom: roste velice bujně a vytváří kulovité až široce kulovité koruny.

Odolnost: proti mrazu je velice odolná.

Stanoviště: vhodná do všech poloh

Tvar a stromořadí: kmenné tvary. Doporučuje se myrobalán, Damas C.

Opylovací poměry: je samosprašná a dobrým opylovačem pro jiné odrůdy slivoní.

Plodnost: je brzká, pravidelná a velká.

Plod: je středně veliký, zepředu oválný.

Slupka: má tmavomodrou barvu s šedomodrým ojíněním.

Stopka: je středně dlouhá, zelená s hnědými skvrnkami a jemně chloupkatá. Je zasazená v mělké stopečné jamce.

Rýha: je povrchová u stopky, směrem k dolní polovině se prohlubuje.

Pecka: je švestkovitá, poněkud širší a tlustá. Dobře se odděluje od dužniny.

Dužnina: je zelenožlutá až oranžová, pevná.

Zrání: zraje koncem srpna.

ZIMMEROVA (pološvestka)

Strom: roste slabě až bujně a vytváří kulovité koruny.

Odolnost: ve dřevě a květu je odolná.

Stanoviště: vhodná do středních poloh, kde vyžaduje dostatečně vlhké a teplé půdy.

Tvar a podnož: kmenné tvary a zákrsky. Má dobrou afinitu ke všem slivoňovým podnožím.

Opylovací poměry: je částečně samosprašná. Dobře ji opylují odrůdy 'Domácí švestka', 'Oullinská', 'Wangenheimova'.

Plodnost: plodí brzy a pravidelně.

Plod: je veliký, mírně podlouhlý, k oběma koncům zaoblený.

Slupka: je tmavofialové barvy se světlým modrofialovým ojíněním a s nepravidelnými rzivými lenticelami. Je středně tlustá, pevná, dá se stáhnout.

Stopka: je krátká, tenká, řídce chloupkatá, zelená s nahnědlými skvrnami. sedí v mělké sotva znatelné stopečné jamce.

Rýha: je nenápadná, často sotva znatelná a dělí plod na dvě nestejně poloviny.

Pecka: je švestkovitého tvaru, tlustá a odděluje se dobře od dužniny.

Dužnina: je zelenavě žlutá, měkká, středně pevná a šťavnatá.

Zrání: zraje v polovině srpna.